

272F

کد کنترل


272

F

# آزمون (نیمه متمرکز) ورود به دوره های دکتری - سال ۱۴۰۱

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۶



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود»  
امام خمینی (ره)

رشته آمار  
(کد ۲۲۳۲)

جدول مواد امتحانی، تعداد، شماره سؤال ها و زمان پاسخ گویی

زمان پاسخ گویی	تا شماره	از شماره	تعداد سؤال	مواد امتحانی
۱۵۰ دقیقه	۴۵	۱	۴۵	مجموعه دروس تخصصی: - مبانی آنالیز ریاضی - ریاضی عمومی ۱ و ۲ - احتمال ۱ و ۲ - استنباط آماری ۱

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤال ها به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می باشد و یا متخلفان برابر مقررات رفتار می شود.

\* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غیبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را  
با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوال ها، نوع و کد کنترل درج شده  
بر روی دفترچه سوال ها و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

۱- فرض کنید  $\{x_n\}$  یک دنباله بازگشتی باشد به طوری که  $x_0 = 1$  و به ازای هر  $n \in \mathbb{N}$ ،  $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)x_{n-1}$  در

این صورت دنباله  $\{x_n\}$ :

- (۱) بی کران است و لذا واگرا است.
- (۲) نزولی و کراندار است و لذا همگرا است.
- (۳) کوشی نیست و لذا واگرا است.
- (۴) صعودی و کراندار است و لذا همگرا است.

۲- کدام گزینه درباره سری  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{1+n^2})$  درست است؟

- (۱) همگرای مطلق است.
- (۲) همگرای مشروط است.
- (۳) واگرا به بی نهایت است.
- (۴) دنباله مجموع جزئی آن کراندار است ولی سری واگرا است.

۳- فرض کنید  $A$  زیرمجموعه ای نامتناهی و سره از  $\mathbb{R}$  باشد و  $A^\circ$  و  $\partial A$  به ترتیب مجموعه نقاط درونی و مرزی  $A$  باشند. کدام گزینه درست است؟

- (۱) اگر  $A^\circ = \emptyset$  متناهی باشد، آنگاه  $A^\circ = \emptyset$ .
- (۲) اگر  $\partial A$  نامتناهی باشد، آنگاه  $A^\circ = \emptyset$ .
- (۳) اگر  $\partial A$  نامتناهی باشد، آنگاه  $(\partial A)^\circ \neq \emptyset$ .
- (۴) اگر  $A$  باز و در  $\mathbb{R}$  چگال باشد، آنگاه  $\partial A$  متناهی است.

۴- فرض کنید تابع  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  به ازای هر  $x, y \in \mathbb{R}$  در شرط  $f(x+y) = f(x) + f(y)$  صدق کند. کدام گزینه معادل پیوستگی  $f$  بر  $\mathbb{R}$  نیست؟

- (۱)  $f$  یکنوا است.
- (۲)  $f$  بر هر بازه بسته و کراندار انتگرال پذیر ریمن است.
- (۳)  $f|_{\mathbb{Q}^\circ}$  (تحدید  $f$  به مجموعه اعداد گنگ)، پیوسته است.
- (۴)  $f|_{\mathbb{Q}}$  (تحدید  $f$  به مجموعه اعداد گویا)، پیوسته است.

۵- فرض کنید تابع حقیقی  $f$  بر بازه  $(a, b)$  مشتق پذیر باشد. کدام گزینه درست است؟

(۱) اگر  $f'$  بر  $(a, b)$  پیوسته باشد، آنگاه  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  موجود است.

(۲) اگر  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  موجود باشد، آنگاه  $f'$  بر  $(a, b)$  کراندار است.

(۳) اگر  $f'$  بر  $(a, b)$  کراندار باشد، آنگاه  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  موجود است.

(۴) اگر  $f$  بر  $(a, b)$  کراندار باشد، آنگاه  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  موجود است.

۶- حاصل  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{(2n)!(2n)!}{n!(4n)!} \right)^{\frac{1}{n}}$  ، کدام است؟

(۱)  $\frac{27}{64}$

(۲)  $\frac{9}{64}$

(۳)  $\frac{27}{16}$

(۴)  $\frac{9}{16}$

۷- حاصل  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\pi^{2n}}{4^n (2n-1)!}$  ، کدام است؟

(۱)  $\frac{\pi}{2}$

(۲)  $\frac{\pi}{4}$

(۳)  $-\frac{\pi}{2}$

(۴)  $-\frac{\pi}{4}$

۸- شعاع همگرایی سری  $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n} x^{n!}$  ، کدام است؟

(۱)  $e$

(۲)  $\frac{1}{e}$

(۳)  $e$

(۴)  $\infty$

(۵)  $1$

۹- معادلات پارامتری زیر معرف کدام منحنی در صفحه است؟

$$\begin{cases} x = 1 + 3 \cosh t \\ y = 2 \sinh t \end{cases} \quad -\infty < t < \infty$$

- (۱) سهمی  
(۲) دو خط متقاطع  
(۳) بیضی  
(۴) یک شاخه از یک هذلولی

۱۰- مقدار انتگرال  $\int_0^{\pi} 2 \sin(\cos^2 x) \cdot \cos(\sin^2 x) dx$  ، کدام است؟

(۱)  $\frac{\pi}{4} \cos 1$

(۲)  $\frac{\pi}{4} \sin 1$

(۳)  $\frac{\pi}{4} \cos 1$

(۴)  $\frac{\pi}{2} \sin 1$

۱۱- مینیمم مقدار تابع  $f(x, y, z) = 2xyz + z^2$  بر سطح کره واحد به مرکز مبدأ، کدام است؟

(۱)  $-\frac{11}{27}$

(۲)  $-\frac{5}{27}$

(۳)  $-\frac{8}{27}$

(۴)  $-\frac{1}{27}$

۱۲- حجم ناحیه محدود به رویه های  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  و  $x^2 + y^2 + 3z = 4$  ، کدام است؟

(۱)  $\pi$

(۲)  $\frac{\pi}{2}$

(۳)  $\frac{\pi}{3}$

(۴)  $\frac{\pi}{4}$

۱۳- اگر خم  $C$  حاصل از برخورد دو رویه  $S_1: x^2 - y^2 - z^2 = \frac{1}{4}$  ,  $S_2: 4x^2 - 2y^2 + 4z^2 = 3$  در نیم فضای  $x > 0$

و در جهت راست گرد باشد و  $F(x, y, z) = (x, -z, y)$  آن گاه  $\oint_C F \cdot dr$  کدام است؟

(۱)  $\frac{\pi}{2}$

(۲)  $\frac{\pi}{3}$

(۳)  $\pi$

(۴)  $\frac{3}{2}$

۱۴- در کیسه اول ۴ مهره قرمز و ۶ مهره آبی و در کیسه دوم ۱۶ مهره قرمز و تعدادی مهره آبی وجود دارد. یک مهره به تصادف از هر کیسه انتخاب می شود، اگر احتمال اینکه هر دو مهره انتخابی هم رنگ باشند به تقریب برابر  $5/44$  باشد، تعداد مهره های آبی کیسه دوم چقدر است؟

(۱) ۱۰

(۲) ۸

(۳) ۶

(۴) ۴

۱۵- شخصی یک تاس سالم را به صورت متوالی پرتاب می کند. اگر شماره روی تاس ۶ بالا بیاید، فوراً برنده می شود (و بازی متوقف می گردد) و اگر شماره روی تاس  $k$  بیاید، برای هر  $k$  بین ۱ تا ۵،  $k$  دقیقه صبر کرده و سپس دوباره تاس را پرتاب می کند. متوسط زمان سپری شده از زمان شروع به پرتاب تا برنده شدن، کدام است؟ (توجه: اگر شخص در اولین پرتاب برنده شود، زمان سپری شده را صفر در نظر بگیرید).

(۱) ۱۵

(۲) ۲۰

(۳) ۲۵

(۴) ۳۰

۱۶- اگر متغیر تصادفی  $X$  دارای توزیع کشی استاندارد با تابع توزیع  $F(x)$  باشد، مقدار  $E\left[\frac{F(X)}{1+F(X)}\right]$ ، کدام است؟

(۱)  $\ln(2)$

(۲)  $\frac{1}{3}$

(۳)  $1 - \ln(2)$

(۴) وجود ندارد.

۱۷- A و B به طور مستقل از هم سکه های را سه بار پرتاب می کنند. با فرض سالم بودن سکه، احتمال آنکه تعداد شیرها در پرتاب های آنها یکسان باشد چقدر است؟

(۱)  $\frac{1}{8}$

(۲)  $\frac{11}{64}$

(۳)  $\frac{5}{16}$

(۴)  $\frac{7}{64}$

۱۸- اگر X یک متغیر تصادفی یواسون باشد، آنگاه مقدار  $\frac{E[X(X-1)(X-2)(X-3)]}{E[X(X-1)]}$  کدام است؟

(۱)  $\frac{E[X^4]}{E[X^2]}$

(۲)  $E[X(X-1)]$

(۳)  $E[X^2]$

(۴)  $E[(X-2)(X-3)]$

۱۹- فرض متغیر تصادفی X دارای توزیع یکنواخت  $[0, 1]$  باشد، تابع چگالی احتمال  $Y = \frac{X}{1+X}$  کدام است؟

(۱)  $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\ln 2 (1-y)} & 0 \leq y \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{سایر نقاط} \end{cases}$

(۲)  $f_Y(y) = \begin{cases} 2y(1-y) & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{سایر نقاط} \end{cases}$

(۳)  $f_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y)^2 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{سایر نقاط} \end{cases}$

(۴)  $f_Y(y) = \begin{cases} (1-y)^{-2} & 0 \leq y \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{سایر نقاط} \end{cases}$

۲۰- اگر  $Y$  روی فاصله  $[-1, 3]$  دارای توزیع یکنواخت باشد، تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی  $U = Y^2$ ، کدام است؟

$$f(u) = \begin{cases} \frac{1}{8\sqrt{u}} & 0 \leq u \leq 1 \\ \frac{1}{4\sqrt{u}} & 1 < u \leq 9 \end{cases} \quad (1)$$

$$f(u) = \begin{cases} \frac{1}{4\sqrt{u}} & 0 \leq u \leq 1 \\ \frac{1}{8\sqrt{u}} & 1 < u \leq 9 \end{cases} \quad (2)$$

$$f(u) = \begin{cases} \frac{1}{2} & 0 \leq u \leq 1 \\ \frac{1}{6} & 1 < u \leq 9 \end{cases} \quad (3)$$

(۴) دارای توزیع یکنواخت روی  $[1, 9]$

۲۱- فرض کنید تابع مولد گشتاور متغیر تصادفی  $X$  برابر  $M_X(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{t}{3}\right)^n$  باشد. مقدار واریانس  $X$ ، کدام است؟

$$\frac{1}{3} \quad (1)$$

$$\frac{1}{9} \quad (2)$$

$$\frac{1}{27} \quad (3)$$

$$\frac{1}{81} \quad (4)$$

۲۲- فرض کنید  $X$  و  $Y$  متغیرهای تصادفی مستقل و هم توزیع از  $\text{Bin}\left(3, \frac{1}{4}\right)$  باشند. مقدار  $E(3X - 2Y | X + Y = 2)$ ، کدام است؟

$$1 \quad (1)$$

$$\frac{3}{4} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \quad (3)$$

$$\frac{1}{4} \quad (4)$$

۲۲- فرض کنید  $X$  و  $Y$  متغیرهای تصادفی مستقلی باشند به طوری که  $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$  و  $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$  است. تحت چه شرطی  $L_1 = C_1X + C_2Y$  و  $L_2 = C_3X + C_4Y$  مستقل هستند؟

$$C_1 + C_2 + C_3 + C_4 = 0 \quad (1)$$

$$C_1C_2 + C_3C_4 = 0 \quad (2)$$

$$C_1C_3 + C_2C_4 = 0 \quad (3)$$

$$C_1C_4 + C_2C_3 = 0 \quad (4)$$

۲۴- فرض کنید  $X_1, X_2, X_3$  مستقل و به ترتیب دارای توزیع نمایی با میانگین های  $\frac{1}{\lambda_1}, \frac{1}{\lambda_2}, \frac{1}{\lambda_3}$  باشند.

$P(X_1 = \min\{X_1, X_2, X_3\})$  کدام است؟

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} \quad (1)$$

$$\frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)}}{e^{-\lambda_1}} \quad (2)$$

$$\frac{e^{-\lambda_1}}{(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)} \quad (3)$$

$$\frac{e^{-\lambda_1}}{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)}} \quad (4)$$

۲۵- فرض کنید  $X$  و  $Y$  متغیرهای تصادفی گسسته با تابع جرم احتمال توأم زیر باشند.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} p^r(1-p)^{x+y-r} & x, y = 1, 2, \dots; 0 < p < 1 \\ 0 & \text{سایر نقاط} \end{cases}$$

$P(Y = 2X)$  کدام است؟

$$\frac{p^r(1-p)}{1-(1-p)^r} \quad (1)$$

$$\frac{p^r(1-p)}{(1-p)^r(1-p)^r} \quad (2)$$

$$\frac{p(1-p)^r}{1-(1-p)^r} \quad (3)$$

$$\frac{p^r}{(1-p)^r(1-(1-p)^r)} \quad (4)$$

۲۶- فرض کنید  $X_1, X_2, X_3$  یک نمونه تصادفی از توزیع  $U(0, 1)$  باشد. اگر  $L = \min(X_1, X_2, X_3)$  و  $M = \max(X_1, X_2, X_3)$  باشد، آنگاه مقدار  $P(M \leq m, L \leq \ell)$  کدام است؟ ( $m \geq \ell$ )

$$2m^r - 2(m-\ell)^r \quad (1)$$

$$2m^r - 2(m-\ell)^r \quad (2)$$

$$2m^r - 2(m-\ell)^r \quad (3)$$

$$m^r - (m-\ell)^r \quad (4)$$



۲۷- فرض کنید دنباله ای از متغیرهای تصادفی باشد به طوری که

$$P\left[X_n = -\frac{1}{n}\right] = P\left[X_n = \frac{1}{n}\right] = \frac{1}{2} \quad \forall n \geq 1$$

اگر  $F(x)$  توزیع حدی  $\{X_n\}_{n \geq 1}$  باشد، کدام گزینه صحیح است؟

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2} & x = 0 \\ 1 & 0 < x \end{cases} \quad (1)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} < x \\ 1 & x \geq 1 \end{cases} \quad (2)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & 0 \leq x \end{cases} \quad (3)$$

(۴) توزیع حدی وجود ندارد.

۲۸- فرض کنید  $X_1, X_2, \dots, X_n$  و  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  دو نمونه تصادفی مستقل از هم به ترتیب از توزیع های  $N(0, 1)$  و  $\text{Bin}(1, p)$  باشند. اگر قرار دهیم  $Z_i = X_i Y_i$ ، در این صورت آماره بسنده مینیمال برای  $(\theta, p)$ ، کدام است؟

$$\left( \sum_{i=1}^n I(Z_i = 0), \sum_{i=1}^n I(Z_i = 1) \right) \quad (1)$$

$$\left( \sum_{i=1}^n Z_i, \sum_{i=1}^n I(Z_i = 0) \right) \quad (2)$$

$$\left( \sum_{i=1}^n Z_i I(Z_i = 1), \sum_{i=1}^n Z_i I(Z_i = 0) \right) \quad (3)$$

$$\left( \sum_{i=1}^n Z_i, \sum_{i=1}^n I(Z_i = 1) \right) \quad (4)$$

۲۹- اگر  $X_1, X_2, \dots, X_n$  نمونه ای تصادفی از توزیع با تابع چگالی  $f_\theta(x) = e^{x-\theta}$ ،  $-\infty < x \leq \theta$  باشد،

$$\left( S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) \text{ کدام است؟ } E(X_{(n)} S^2)$$

$$\theta - \frac{1}{n} \quad (1)$$

$$\theta - \frac{1}{n+1} \quad (2)$$

$$\theta + \frac{1}{n} \quad (3)$$

$$\theta + \frac{1}{n+1} \quad (4)$$

۳۰- فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از توزیع یکنواخت روی بازه  $(\theta, \theta + |\theta|)$  باشد که در آن  $\theta \neq 0$  است.

برآورد گشاور  $\theta$  کدام است؟

$$\hat{\theta} = \frac{2}{3} \bar{X} I(\bar{X} > 0) + \frac{1}{3} \bar{X} I(\bar{X} < 0) \quad (1)$$

$$\hat{\theta} = \frac{2}{3} \bar{X} I(\bar{X} > 0) + \frac{2}{3} \bar{X} I(\bar{X} < 0) \quad (2)$$

$$\hat{\theta} = \frac{3}{2} \bar{X} I(\bar{X} > 0) + \frac{2}{3} \bar{X} I(\bar{X} < 0) \quad (3)$$

$$\hat{\theta} = \frac{2}{3} \bar{X} I(\bar{X} > 0) + \frac{2}{3} \bar{X} I(\bar{X} < 0) \quad (4)$$

۳۱- فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از توزیع  $\text{Bin}\left(2, \frac{\theta}{1+\theta}\right)$  باشد که در آن  $\theta > 0$  است. برآوردگر

ماکسیمم درست نمایی  $\theta$  کدام است؟

$$\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}} \quad (1)$$

$$\frac{\bar{X}}{2-\bar{X}} \quad (2)$$

$$\frac{\bar{X}}{1+\bar{X}} \quad (3)$$

(4) وجود ندارد.

۳۲- فرض کنید  $X_1, X_2, \dots, X_n$  نمونه ای تصادفی (مستقل و هم توزیع) از جامعه ای با تابع چگالی احتمال زیر باشد.

$$f_{\theta}(x) = \frac{\theta-1}{3} \left(1 + \frac{x}{3}\right)^{-\theta}; \quad x > 0, \quad \theta > 1$$

برآوردگر ماکزیمم درست نمایی برای پارامتر  $\theta$ ، کدام است؟

$$1 + \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln\left(1 + \frac{X_i}{3}\right)} \quad (1)$$

$$1 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln\left(1 + \frac{X_i}{3}\right) \quad (2)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln\left(1 + \frac{X_i}{3}\right) \quad (3)$$

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln\left(1 + \frac{X_i}{3}\right)} \quad (4)$$

۳۳- فرض کنید  $X$  دارای تابع چگالی احتمال  $f_{\theta}(x) = \frac{1}{2} e^{-|x-\theta|}; \quad x \in \mathbb{R}, \quad \theta \in \{1, 2, 4\}$  است. با استفاده از یافته

نمونه تصادفی  $x_1 = 1, x_2 = 3$  برآورد ماکزیمم درست نمایی  $\theta$ ، کدام است؟

$$\hat{\theta} = a, \quad a \in \{1, 4\} \quad (1)$$

$$\hat{\theta} = a, \quad a \in \{2, 4\} \quad (2)$$

$$\hat{\theta} = a, \quad a \in \{1, 2\} \quad (3)$$

$$\hat{\theta} = a, \quad a \in \{1, 2, 4\} \quad (4)$$

۳۴- اگر  $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(\theta, 1)$  که  $\theta \in \mathbb{R}$  باشد، برآوردگر UMVUE برای  $P(X_1 < 0)$ ، کدام است؟

( $\Phi$  تابع توزیع نرمال استاندارد است.)

$$\Phi\left(\sqrt{\frac{n-1}{n}} \bar{X}\right) \quad (1)$$

$$\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{n-1}} \bar{X}\right) \quad (2)$$

$$\Phi\left(-\sqrt{\frac{n-1}{n}} \bar{X}\right) \quad (3)$$

$$\Phi\left(-\sqrt{\frac{n}{n-1}} \bar{X}\right) \quad (4)$$

۳۵- فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  نمونه ای تصادفی از توزیع  $G(x) = [F(x)]^\theta$  باشد که در آن  $F(x)$  یک تابع توزیع پیوسته معلوم است و  $\theta > 0$  UMVUE پارامتر  $\theta^{-2}$  کدام است؟

$$\frac{1}{n(n-1)} \left[ \sum_{i=1}^n \ln F(X_i) \right]^2 \quad (1)$$

$$\frac{1}{n(n+1)} \sum_{i=1}^n (\ln F(X_i))^2 \quad (2)$$

$$\frac{1}{n(n+1)} \left[ \sum_{i=1}^n \ln F(X_i) \right]^2 \quad (3)$$

$$\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\ln F(X_i))^2 \quad (4)$$

۳۶- فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  نمونه ای تصادفی از توزیع دوجمله ای  $B(1, p)$  باشد و قرار دهید  $T = \sum_{i=1}^n X_i$ . اگر

$h_m(T)$  بهترین برآوردگر ناریب (UMVUE)  $P^m$  باشد، در این صورت بهترین برآوردگر ناریب

$P(X_1 + X_2 > X_3)$  کدام است؟

$$2h_1(T) - 2h_2(T) + 2h_3(T) \quad (1)$$

$$2h_1(T) + 2h_2(T) + 2h_3(T) \quad (2)$$

$$2h_1(T) + 2h_2(T) + 2h_3(T) \quad (3)$$

$$2h_1(T) - 2h_2(T) + 2h_3(T) \quad (4)$$

۳۷- فرض کنید  $Y_1, \dots, Y_n$  یک نمونه تصادفی مستقل و هم توزیع از یک جامعه با تابع چگالی زیر باشد:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{y}}{\theta\sqrt{\pi}} e^{-\frac{y^2}{\theta^2}} & y > 0, \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

یک برآوردگر سازگار بر حسب  $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$  برای  $\theta$  کدام است؟

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}} \bar{Y} \quad (1)$$

$$\sqrt{2\pi} \bar{Y} \quad (2)$$

$$\frac{\pi \bar{Y}}{2} \quad (3)$$

$$\sqrt{2\pi} \bar{Y} \quad (4)$$

۳۸- فرض کنید  $x_1 = 0.5$ ,  $x_2 = 1$ ,  $x_3 = 0.25$  یافته های یک نمونه تصادفی از توزیع یکنواخت پیوسته  $U(0, \theta)$  و  $\theta$

نیز دارای توزیع پیشین یکنواخت پیوسته  $U(0, 2)$  است. تحت تابع زیان توان دوم خطای وزنی  $L(\theta, a) = \left(\frac{a - \theta}{\theta}\right)^2$

برآورد بیز پارامتر  $\theta^3$ ، کدام است؟

(۱)  $\frac{3}{8}$

(۲)  $\frac{15}{32}$

(۳)  $\frac{8}{3}$

(۴)  $\frac{32}{15}$

۳۹- فرض کنید  $X|\theta \sim N(\theta, 1)$  و  $\theta \sim N(0, 1)$ . با در نظر گرفتن تابع زیان  $L(\theta, \delta) = e^{\delta - \theta} - (\delta - \theta) - 1$

برآوردگر بیز  $\theta$ ، کدام است؟

(۱)  $\frac{X}{2} + \frac{1}{4}$

(۲)  $\frac{X}{2} + \frac{1}{2}$

(۳)  $\frac{X}{2} - \frac{1}{4}$

(۴)  $\frac{X}{2} - \frac{1}{2}$

۴۰- فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از توزیع گاما با میانگین  $\frac{\alpha}{\lambda}$  باشد که در آن  $\alpha$  معلوم است. با انتخاب توزیع

پیشین ناسره  $\pi(\lambda) = \frac{1}{\lambda}$ ;  $\lambda > 0$  و تحت زیان توان دوم خطا، برآوردگر بیزی تعمیم یافته برای پارامتر  $\lambda$ ، کدام است؟

(۱)  $n\alpha \sum X_i$

(۲)  $\frac{n\alpha}{\sum X_i}$

(۳)  $\frac{\alpha(n-1)}{\sum X_i}$

(۴)  $\alpha(n-1) \sum X_i$

۴۱- فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  نمونه ای تصادفی از توزیع با تابع چگالی زیر باشد.

$$f_{\theta}(x) = \frac{rx}{\theta^2} e^{-\frac{x}{\theta}}; x > 0, \theta > 0$$

برآوردگر بیزی تعمیم یافته  $\theta$  تحت تابع زیان  $L(\theta, \delta) = (1 - \frac{\delta}{\theta})^2$  و نسبت به پیشین جفریز، کدام است؟

$$\frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(n+\frac{1}{2})} \sqrt{\sum X_i^2} \quad (1)$$

$$\frac{\Gamma(n+\frac{1}{2})}{\Gamma(n+1)} \sqrt{\sum X_i^2} \quad (2)$$

$$\frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(n+\frac{1}{2})} \sum X_i^2 \quad (3)$$

$$\frac{\Gamma(n+\frac{1}{2})}{\Gamma(n+1)} \sum X_i^2 \quad (4)$$

۴۲- فرض کنید  $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Bin}(1, \theta)$  و کلاس برآوردگرهای  $\theta$  به صورت  $\delta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i + a$  باشد. تحت تابع

زیان توان دوم خطا  $(\delta - \theta)^2$  برآوردگر مینیماکس برای  $\theta$  در این کلاس، کدام است؟

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{n+1} \quad (1)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \quad (2)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{n} \quad (3)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (4)$$

۴۳- از میان برآوردگرهای  $D_1, D_2, D_3$  برای پارامتر  $\theta \in [1, 2]$  که به ترتیب دارای توابع مخاطره  $R_1(\theta) = a\theta - 1$

$R_2(\theta) = -\theta^2 + a\theta$  و  $R_3(\theta) = \frac{a}{\theta+1}$  هستند، برآوردگرهای مینیماکس و مجاز به ترتیب کدامند؟

$$D_1, D_1 \quad (1)$$

$$D_2, D_2 \quad (2)$$

$$D_2, D_1 \quad (3)$$

$$D_1, D_2 \quad (4)$$

۴۴- مسئله تصمیم بدون داده با تابع زیان زیر را در نظر بگیرید.

$\theta \backslash A$	$a_1$	$a_2$	$a_3$
$\theta_1$	۰	۱۰	۲
$\theta_2$	۸	۰	۳

عمل مینیماکس آمیخته کدام است؟

(۱)  $\left(\frac{1}{8}, 0, \frac{7}{8}\right)$

(۲)  $\left(\frac{1}{9}, \frac{8}{9}, 0\right)$

(۳)  $\left(\frac{1}{9}, 0, \frac{8}{9}\right)$

(۴)  $\left(\frac{1}{8}, \frac{7}{8}, 0\right)$

۴۵- فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  نمونه ای تصادفی از  $\text{Bin}(1, p)$  باشد، در برآورد پارامتر  $p$  فرض کنید تابع زیان را  $\frac{(\delta - p)^2}{p(1-p)}$

در نظر بگیریم. کدام یک از گزاره های زیر درست است؟

(۱)  $\frac{n\bar{X}}{n+1}$  یک برآوردگر مجاز است.

(۲)  $\bar{X}$  یک برآوردگر مجاز است.

(۳)  $\frac{n+1}{n}\bar{X}$  یک برآوردگر مجاز است.

(۴)  $\frac{n-1}{n}\bar{X}$  یک برآوردگر مجاز است.