



226F

کد کنترل

226

F

آزمون (نیمه متمرکز) ورود به دوره های دکتری - سال ۱۴۰۱

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۶



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

رشته بیوتکنولوژی دامپزشکی
(کد ۲۷۱۹)

جدول مواد امتحانی، تعداد، شماره سؤال ها و زمان پاسخ گویی

زمان پاسخ گویی	تا شماره	از شماره	تعداد سؤال	مواد امتحانی
۱۲۰ دقیقه	۹۰	۱	۹۰	مجموعه دروس تخصصی: - بیولوژی سلولی و مولکولی - بیوشیمی - میکروبیولوژی و ایمونولوژی - ژنتیک

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤال ها به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می باشد و با متخلفان برابر مقررات رفتار می شود.

* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غیبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

- ۱- کدام یک از گزینه‌های زیر با مهار تخریب (Depolymerization) میکروتوبول‌ها، مانع از پیشرفت آنافاز می‌شود؟
 (۱) تاکسول (Taxol) (۲) نوکودازول (Nocodazole) (۳) وین‌بلاستین (Vinblastine) (۴) کلشی سین (Colchicine)
- ۲- کدام رابطه سلولی زیر (Cell junction) اسکلت سلولی دو سلول مجاور را به هم مرتبط می‌کند؟
 (۱) دسموزوم (۲) همی دسموزوم (۳) اتصالات سخت (Tight junction) (۴) اتصالات فاصله انداز (Gap junction)
- ۳- در آزمایشی قصد جدا کردن ریبوزوم‌های یک سلول یوکاریوتی را دارید، از کدام ماده زیر برای تخریب غشای سلولی استفاده می‌کنید؟
 (۱) اوره (۲) SDS (۳) الکل اتیلیک (۴) سالیین هایپرتونیک
- ۴- تمام گزینه‌های زیر از محرک‌های آپوپتوز هستند، به جز:
 (۱) Bid (۲) Bcl2 (۳) Cyt c (۴) Fas ligand
- ۵- کدام مولکول سریع‌تر از خلال یک غشاء دو لایه لیپیدی عبور می‌کند؟
 (۱) آب (۲) فروکتوز (۳) اتانول (۴) یون متیزبوم
- ۶- در پژوهشی مقداری هموزنات سلولی را از سرعت پایین و به تدریج با سرعت‌های بالاتر و سپس سرعت‌های بسیار بالا سانتریفیوژ کردیم. ترتیب ساختمان‌ها و ارگان‌های سلولی در رسوب ایجاد شده از بالا به پایین چگونه است؟
 (۱) هسته‌ها - میتوکندری - لیزوزوم‌ها - وزیکول‌های کوچک
 (۲) سلول‌های کامل - اسکلت سلولی - پراکسی‌زوم - ریبوزوم
 (۳) ریبوزوم‌ها - وزیکول‌های کوچک - لیزوزوم - اسکلت سلولی
 (۴) وزیکول‌های کوچک - اسکلت سلولی - میتوکندری‌ها - سلول کامل
- ۷- اسمولاریته گلبول‌های قرمز نوعی جاندار مورد مطالعه شما ۵۰۰ mosmol/L تعیین شده است، برای ایجاد یک محلول ایزوتونیک برای این گلبول‌های قرمز چه مقدار نمک طعام را در ۱۰۰ ml آب حل می‌کنید؟ (توجه: ضریب اسمزی نمک طعام را ۱ در نظر بگیرید)
 (۱) ۱ mol (۲) ۱۰۰ mmol (۳) ۲۵۰ mmol (۴) ۲۵ mmol
- ۸- ویژگی‌های میکروسکوپی یک بافت مجهول به صورت زیر گزارش شده است:
 تعداد زیاد سلول با تمایز اندک، هستک‌های واضح، هسته‌ای یوکروماتین و مشاهده میتوزهای متعدد، کدام گزینه زیر بیشتر به توصیف بالا شباهت دارد؟
 (۱) بافت چربی (۲) بافت نرمال کبدی (۳) یک سرطان بدخیم (۴) بافت نرمال لوزالمعده

- ۹- کدام یک از سایکلین‌های زیر برای دوره کوتاه‌تری از چرخه سلولی در غلظت‌های عملکردی، داخل سلول یافت می‌شود؟
 cyclin S (۱) cyclin M (۲) cyclin G₁ (۳) cyclin G₁/S (۴)
- ۱۰- کدام گزینه زیر یک عملکرد پروتئین‌های غشایی نمی‌باشد؟
 (۱) انتقال مواد (۲) عملکرد آنزیمی
 (۳) تنظیم سیالیت غشاء (۴) شناسایی سلول - سلول
- ۱۱- شبکه آندوپلاسمی زبر (Rough endoplasmic reticulum) در سلول کدام یک از بافت‌های زیر گسترش بیشتری دارد؟
 (۱) پانکراس (۲) غده پستانی (۳) غده فوق کلیوی (۴) بیضه و تخمدان
- ۱۲- در ساختار کدام گزینه زیر واحدهای α, β tubulin مشاهده نمی‌شود؟
 (۱) تازک یوکاریوتی (۲) تازک پروکاریوتی (۳) سانتربول (۴) میکروتوبول
- ۱۳- سلول‌های انسانی از چه روشی برای جذب کلسترول مورد نیاز بهره می‌گیرند؟
 (۱) پینوسیتوز (۲) فاگوسیتوز (۳) آگروسیتوز (۴) اندوسیتوز وابسته به لیگاند
- ۱۴- جایگاه سنتز و انتقال کربوهیدرات به برخی از پروتئین‌ها و لیپیدهای غشایی، کدام قسمت سلول می‌باشد؟
 (۱) دستگاه گلژی - لیزوزم (۲) شبکه آندوپلاسمی - لیزوزم
 (۳) شبکه آندوپلاسمی - دستگاه گلژی (۴) لایه خارجی غشاء هسته - شبکه آندوپلاسمی
- ۱۵- کدام نوع اتصال بین سلولی در جانوران مشابه پلاسمودسماتای گیاهی است؟
 (۱) همی دسموزوم (۲) دسموزوم‌ها
 (۳) اتصالات محکم (Tight junction) (۴) اتصالات فاصله انداز (Gap junction)
- ۱۶- جایگاه اکسیداسیون اسیدهای چرب در داخل کدام از کانال زیر سلولی است؟
 (۱) لیزوزوم (۲) پراکسیزوم (۳) میتوکندری (۴) میتوکندری و پراکسیزوم
- ۱۷- پروتئین‌های اختصاصی کدام قسمت سلول از دستگاه گلژی عبور نمی‌کنند؟
 (۱) لیزوزوم (۲) میتوکندری (۳) پراکسیزوم (۴) غشا سلول
- ۱۸- کدام ساختار زیر سلولی غشاء مضاعف ندارد؟
 (۱) لیزوزوم (۲) میتوکندری (۳) کلروپلاست (۴) هسته
- ۱۹- کدام گزینه زیر نتیجه یک خطای دامیناسیون سینتوزین اصلاح نشده در رشته DNA را به درستی بیان می‌کند؟
 (۱) تغییر جفت باز GC به AT در هر دو رشته دختری
 (۲) تغییر جفت باز AT به GC در یکی از رشته‌های دختری
 (۳) تغییر جفت باز GC به AT در یکی از رشته‌های دختری
 (۴) حذف تک نوکلئوتیدی جفت باز GC در هر دو رشته دختری
- ۲۰- تمام گزینه‌های زیر دربارهٔ ترانسپوزون‌های DNA محور (DNA-dependent transposons) صحیح است، به جز:
 (۱) ندرتاً جابه‌جا می‌شوند.
 (۲) به واسطه یک رشته RNA از بخشی از DNA به جای دیگر جابه‌جا می‌شوند.
 (۳) مسئول بروز و انتقال مقاومت‌های آنتی بیوتیکی در باکتری‌ها هستند.
 (۴) زن‌های مورد نیاز برای سنتز آنزیم‌های درگیر در جابه‌جایی خود را حمل می‌کنند.
- ۲۱- همه آنزیم‌های زیر در گلوکونوز کبیدی نقش دارند، به جز:
 (۱) پیرووات کیناز (۲) گلوکز ۶- فسفاتاز
 (۳) پیرووات کربوکسیلاز (۴) فسفو اتول پیرووات کربوکسی کیناز

- ۲۲- محصول نهایی بتا اکسیداسیون اسید چرب فرد گرین کدام است؟
 (۱) بوتیریل کوآ (۲) مالونیل کوآ (۳) سوکسینیل کوآ (۴) پروپینیل کوآ
- ۲۳- NADPH در کدام یک از مسیرهای متابولیکی زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
 (۱) گلیکولیز (۲) لیپوز (۳) پنتوز فسفات (۴) گلیکوزنولیز
- ۲۴- پدوستات و فلوراید به ترتیب مهارکننده کدام یک از آنزیم‌های مسیر گلیکولیز هستند؟
 (۱) انولاز و فسفوگلیسرات کیناز
 (۲) گلیسرآلدئید-۳- فسفات دهیدروژناز و انولاز
 (۳) فسفو گلیسرات کیناز و پیرووات دهیدروژناز
 (۴) پیرووات دهیدروژناز و گلیسرآلدئید-۳- فسفات دهیدروژناز
- ۲۵- کدام آنزیم تنظیم‌کننده چرخه سنتز اسید چرب می‌باشد؟
 (۱) پالمیتیل داسیلاز (۲) اسید چرب تیو کیناز
 (۳) استیل کوآ کریوگسیلاز (۴) بتاکتو استیل ACP سنتتاز
- ۲۶- کدام هورمون می‌تواند گلیکوزنولیز را در کبد و عضله افزایش دهد؟
 (۱) ای پی نفرین (۲) تیروکسین (۳) انسولین (۴) گلوکاگون
- ۲۷- مسیر سنتز هم توسط کدام آنزیم تنظیم می‌شود؟
 (۱) فروشلاتاز (۲) اوروپورفیرینوزن I سنتتاز
 (۳) اوروپورفیرینوزن دکربوکسیلاز (۴) آمینولولنیک سنتتاز
- ۲۸- آمونیاک حاصل از متابولیسم اسیدهای آمینه در مغز عمدتاً به صورت کدام اسید آمینه به کبد منتقل می‌شود؟
 (۱) گلوتامین (۲) گلوتامات (۳) اسپارژین (۴) آلانین
- ۲۹- از بتا اکسیداسیون کدام اسید چرب بیشترین ATP حاصل می‌شود؟
 (۱) اولئیک اسید (۲) استئاریک اسید (۳) لینولنیک اسید (۴) لینولئیک اسید
- ۳۰- کدام یک از روندهای متابولیک زیر در میتوکندری انجام نمی‌گردد؟
 (۱) تولید اجسام کتون (۲) چرخه اسید سیتریک
 (۳) پیوستن اسید چرب (۴) فسفریلاسیون اکسیداتیو
- ۳۱- کدام یک از دی ساکاریدهای زیر حاوی گالاکتوز است؟
 (۱) لاکتوز (۲) ساکارز (۳) ترهالوز (۴) مالتوز
- ۳۲- کدام یک از اسیدهای آمینه زیر الکلی نمی‌باشد؟
 (۱) سرین (۲) تیروزین (۳) ترئونین (۴) فنیل آلانین
- ۳۳- تمام موارد زیر در تا خوردگی صحیح پروتئین‌ها دخیل اند، به جز:
 (۱) پروتون‌ها (۲) جاپرون‌ها
 (۳) جاپروتین‌ها (۴) آنزیم دی‌سولفید ایزومراز
- ۳۴- کدام ماده موجب هم‌بار کردن پروتئین‌ها، در جریان الکتروفورز عمودی روی ژل پلی آکریلامید می‌شود؟
 (۱) SDS (۲) TAB (۳) EDTA (۴) CTAB
- ۳۵- برای سنتز کدام ترکیب گلیسین مورد نیاز نمی‌باشد؟
 (۱) هم (۲) کراتین (۳) سروتونین (۴) گلوتامین

- ۳۶- کدام روش آزمایشگاهی زیر را برای جداسازی یک قطعه ۱۵ کیلو جفت بازی از یک نمونه مخلوط DNA انتخاب می‌کنید؟
 (۱) HPLC
 (۲) الکتروفورز ژل آگارز
 (۳) کروماتوگرافی تبادل کاتیونی
 (۴) الکتروفورز دو بعدی ژل پلی‌اکریل‌آمید
- ۳۷- فیناستراید (finasteride) دارویی است که با مهار آنزیم ۵- α ردوکتاز مانع از تولید فرم فعال تستوسترون در مردان می‌شود. این دارو، V_{max} و K_m این آنزیم را با ضریب مشخصی کاهش می‌دهد. کدام گزینه مکانیسم مهار فیناستراید را بهتر بیان می‌کند؟
 (۱) مهار نارقابتی
 (۲) مهار غیررقابتی
 (۳) مهار رقابتی
 (۴) مهار مخلوط
- ۳۸- هر پروتئین در نقطه ایزوالکتریک خود
 (۱) دارای بار مثبت می‌باشد.
 (۲) کمترین خلالیت را دارد.
 (۳) به شکل دلتا توره وجود دارد.
 (۴) بیشترین جذب نوری را دارد.
- ۳۹- تریسج کدام یک از هورمون‌های زیر توسط سیستم رنین - آنژیوتانسین تنظیم می‌گردد؟
 (۱) دوپامین
 (۲) استرادیول
 (۳) کورتیزول
 (۴) آلدوسترون
- ۴۰- کدام اسید آمینه زیر در تشکیل پیوند N-گلیکوزیدی نقش دارد؟
 (۱) Ser
 (۲) Asn
 (۳) Thr
 (۴) Tyr
- ۴۱- مقاومت دارویی میکوباکتریوم توبرکلوزیس در برابر ایزونیاژید به واسطه کدام یک به وقوع می‌پیوندد؟
 (۱) موتاسیون در ژن کدکننده 16S rRNA
 (۲) موتاسیون در ژن DNA ژیراز (gyrA)
 (۳) حذف یا موتاسیون در ژن کاتالاز - پراکسیداز (katG)
 (۴) تغییر در ژن rpoB (زیر واحد بتا آنزیم RNA پلی‌مرز)
- ۴۲- لیستریولیزین O
 (۱) موجب ورود باکتری به داخل سلول‌های غیربیگانه خوار می‌گردد.
 (۲) عامل اصلی حدت بوده و قبل از بیگانه خواری آزاد می‌شود.
 (۳) پروتئین سطحی دیواره سلولی است که موجب تسهیل بیگانه خواری می‌گردد.
 (۴) نوعی سیتولیزین فعال شونده است که موجب لیز غشاء فاگوزوم می‌گردد.
- ۴۳- اساس گروه‌بندی لانسفیلد در استرپتوکوک‌ها کدام است؟
 (۱) نوع اسید تکونیک جداری
 (۲) نوع همولیز و استریتولیزین‌های O و S
 (۳) تفاوت‌های سرولوژی در پروتئین M جداری
 (۴) تفاوت‌های سرولوژیکی در کربوهیدرات موجود در دیواره سلولی به نام جزء C
- ۴۴- کدام یک از باکتری‌های زیر، آرایشی شبیه حروف چینی دارد؟
 (۱) کلستریدیوم تتانی
 (۲) باسیلوس آنتراسیس
 (۳) کورینه باکتریوم دیفتریه
 (۴) مایکوباکتریوم بویس
- ۴۵- رنگ آمیزی گیمنز (Gimenez) در تشخیص میکروسکوپی کدام یک استفاده می‌شود؟
 (۱) بورلیا
 (۲) ریکتزیا
 (۳) کلامیدیا
 (۴) میکوپلاسما

- ۴۶- کدام یک از آزمایش های زیر برای تفریق سالمونلا و پروتئوس به کار می رود؟
 (۱) آوره آز (۲) ایندول
 (۳) وزس پروسکوئر (۴) تولید H_2S
- ۴۷- زنده ماندن *Rodococcus equi* در داخل ماکروفاژها به چه دلیل می باشد؟
 (۱) ممانعت از اتصال فاکولیزوزوم (۲) تولید کلاسترول اکسیداز
 (۳) وجود ترکیبات کپسولی (۴) تولید فسفولیپاز C
- ۴۸- کدام یک از باکتری های زیر به عوامل رشد X و V نیاز دارد؟
 (۱) بردتلا (۲) هموفیلوس (۳) موراکسلا (۴) تیلاورا
- ۴۹- کپسول در *E. coli* است و تنها در ایجاد می شود.
 (۱) پروتئینی - بدن (۲) پلی ساکاریدی - بدن
 (۳) پروتئینی - محیط کشت (۴) پلی ساکاریدی - محیط کشت
- ۵۰- لیزواستافین توسط تولید می گردد.
 (۱) استافیلوکوکوس اینترمدیوس (۲) استافیلوکوکوس اورئوس
 (۳) استافیلوکوکوس سیمولانس (۴) استافیلوکوکوس کواگولانس
- ۵۱- باکتری های سطح پوست فضا نوردانی که در خارج از جو زندگی می کنند در کدام گروه باکتریایی زیر قرار می گیرند؟
 (۱) هوازی اجباری هستند.
 (۲) بی هوازی اجباری هستند.
 (۳) میکروآئروفیلیک (Microaerophilic) هستند.
 (۴) تقریباً شبیه باکتری های سطح پوست افراد ساکن در زمین هستند.
- ۵۲- DNA ژنومی کدام یک خطی است؟
 (۱) پرستینا (۲) سالمونلا تیفی
 (۳) اشیشیاکلی (۴) بورلیا بورگدورفری
- ۵۳- در باکتری های گرم مثبت نسبت RNA به DNA کدام است؟
 (۱) ۸ به ۱ (۲) ۴ به ۱ (۳) ۱ به ۲ (۴) ۱ به ۱
- ۵۴- آنزیم ایزوسینرات لیاز مربوط به کدام یک از چرخه های زیر است؟
 (۱) کریس (۲) گلی اسیلات (۳) انترودوروف (۴) فسفولگونات
- ۵۵- در مرحله رشد لگاریتمی باکتری ها
 (۱) متحمل تغییرات شیمیایی می شوند.
 (۲) آنزیم های لازم جهت تغذیه تولید می کنند.
 (۳) نسبت به مواد فیزیکی و شیمیایی مقاوم ترند.
 (۴) نسبت به سرم و مواد شیمیایی حساسیت بیشتری دارند.
- ۵۶- کاشف پدیده تخفیف حدت یافتگی باکتری ها (Attenuation) کدام یک می باشد؟
 (۱) کج (۲) جنر
 (۳) پاستور (۴) پل ارلیش

۵۷- کدام یک از جملات زیر درست است؟

- (۱) پلاسمیدهای الحاق پذیر فقط در حمل ژن های پدیده جنسیت نقش دارند.
- (۲) مکانیسم پدیده جنسیت در باکتری های گرم مثبت و گرم منفی یکسان است.
- (۳) پلاسمیدها در باکتری ها به صورت مولکول های دو رشته ای حلقوی و نیز خطی هستند.
- (۴) انتقال پلاسمیدها به طریقه جنسی فقط بین دوسویه از یک گونه باکتری اتفاق می افتد.

۵۸- پرده بیرونی در باکتری های گرم منفی

- (۱) با بیماری زایی باکتری ارتباطی ندارد.
- (۲) مانع عبور ترکیبات هیدروفوب می گردد.
- (۳) موجب حساسیت در برابر دترجنت ها می شود.
- (۴) در باکتری های بیماری زا بیشتر توسعه یافته است.

۵۹- در روش تهیه آنتی بادی مونوکلونال از پلی اتیلن گلیکول به چه منظور استفاده می شود؟

- (۱) ایمن سازی موش
- (۲) ترشح آنتی بادی از سلول هیبریدوما
- (۳) نامبر ساختن آنتی بادی جدا شده از طحال موش
- (۴) ادغام غشای آنتی بادی جدا شده از طحال موش و سلول های میلومایی

۶۰- کدام مورد در خصوص مولکول CD_۱ درست است؟

- (۱) انواع CD_۱ ممکن است همزمان بر سطح یک سلول بیان شوند.
- (۲) برخلاف MHCI در CD_۱ پلی مورفیسم مشخص دیده نمی شود.
- (۳) برخلاف MHCI همراه با بتا دو میکروگلوبولین بیان نمی شود.
- (۴) ساختمان CD_۱ شبیه MHCI است.

۶۱- کدام عامل باعث تشکیل کمپلکس اینفلامازوم و ایجاد ترشح سایتوکاین های انتهایی نمی شود؟

- (۱) محصولات باکتریایی
- (۲) رادیکال های آزاد اکسیژن
- (۳) افزایش پتاسیم داخل سلولی
- (۴) افزایش ATP خارج سلولی

۶۲- برای افزایش قدرت آگلوتیناسیون آنتی بادی در واکنش آنتی بادی - آنتی ژن از تمام روش ها می توان استفاده کرد، به جز:

- (۱) اضافه کردن مقدار آنتی ژن
- (۲) استفاده از آنتی هیومن آنتی بادی
- (۳) سانتریفوژ کردن مخلوط آنتی بادی - آنتی
- (۴) قرار دادن مخلوط آنتی بادی - آنتی ژن در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد

۶۳- مفهوم اصلی MHC restriction در کدام جمله درست است؟

- (۱) TCR ها مجموعه آنتی ژن های پپتیدی و MHC خودی را شناسایی می کند.
- (۲) TCR ها مجموعه آنتی ژن های پپتیدی خودی و MHC خودی را شناسایی می کند.
- (۳) TCR ها مجموعه آنتی ژن های پپتیدی غیر خودی و MHC غیر خودی را شناسایی می کنند.
- (۴) TCR ها مجموعه آنتی ژن های پپتیدی خودی و MHC غیر خودی را شناسایی می کنند.

۶۴- در تعیین سلول های T ترشح کننده سایتوکاین کدام روش استفاده می شود؟

- (۱) الیزا
- (۲) فلوسیتومتری
- (۳) MHC ترانمر
- (۴) فعال سازی پلی کلونال T

- ۶۵- کدام اینفلامازوم‌ها در کراتینوسیت‌های پوست درگیر واکنش التهابی بیان می‌شود؟
 (۱) AIM2
 (۲) CDSs
 (۳) NLRPs
 (۴) Non NLR pyrin
- ۶۶- کدام یک از سلول‌های ایمنی زیر بیشترین مولکول‌های شبه تول (TLRs) در سطح خود دارند؟
 (۱) سلول‌های دندریتیک
 (۲) T-cell های خاطره
 (۳) B-cell های خاطره
 (۴) نوتروفیل‌ها
- ۶۷- بیان مولکول CD200 و گیرنده آن بر سطح سلول‌های میکروگلیال مغز چه واکنشی در پی خواهد داشت؟
 (۱) کاهش پاسخ به التهاب
 (۲) تولید سایتوکاین‌های التهابی
 (۳) پاسخ به آنتی ژن‌های میکروبی
 (۴) افزایش آستانه تحریک در پاسخ به التهاب
- ۶۸- کدام جمله در مورد پاسخ‌های ایمنی پستانداران درست است؟
 (۱) در مقابل antivenom therapy به صورت فعال می‌باشد.
 (۲) در مقابل واکنش‌های ریکامینانت (Recombinant) ضعیف است.
 (۳) در مقابل antivenom therapy همراه با ایجاد T-cell های خاطره می‌باشد.
 (۴) در مقابل antivenom therapy همراه با ایجاد B-cell های خاطره می‌باشد.
- ۶۹- کدام آزمایش قابلیت Patient-Side دارد؟
 (۱) CFT
 (۲) ME۲
 (۳) الیزا
 (۴) ایمونوگروماتوگرافی
- ۷۰- کدام حالت احتمال در Clonal abortion مطرح است؟
 (۱) اختلال اتوایمیون
 (۲) ازدیاد حساسیت
 (۳) حاملین بدون نشانه
 (۴) نقصان مرکب ایمنی
- ۷۱- ژن‌های حامل اطلاعات سنتز پروتئینی و ژن‌های حامل توالی tRNA ها به ترتیب توسط کدام RNA pol های یوکاریوتی رونویس برداری می‌شوند؟ (از راست به چپ)
 (۱) RNA pol III- RNA pol II
 (۲) RNA pol I, II- RNA pol II
 (۳) RNA pol I, II, III- RNA pol II
 (۴) RNA pol I, II, III- RNA pol I, II
- ۷۲- در پژوهشی قصد دارید فرآیند رونویسی یک سلول یوکاریوتی را در صورت عدم شناسایی TATA box بررسی کنید، برای رسیدن به این هدف کدام فاکتور رونویسی را اختصاصاً مهار می‌کنید؟
 (۱) TFI
 (۲) TFII F
 (۳) TFII D
 (۴) TFII H
- ۷۳- کدام یک از گزینه‌های زیر کاربرد DNA microarray را به درستی بیان می‌کنید؟
 (۱) وسیله‌ای جهت توالی‌یابی سریع توالی‌های ژنومی
 (۲) وسیله‌ای جهت بررسی هم‌زمان بیان تعداد زیادی ژن
 (۳) وسیله‌ای جهت جداسازی یک ژن اختصاصی از یک توالی ژنومی
 (۴) وسیله‌ای جهت القا و وارد کردن DNA لیگاز به یک سلول باکتریایی
- ۷۴- در فرآیند پردازش (Splicing) کدام جزء ساختمان Spliceosome واکنش برش (Excision) را کاتالیز می‌کند؟
 (۱) DNA
 (۲) lipid
 (۳) RNA
 (۴) protein

۷۵- یک ژن یوکاریوتی به درون DNA یک باکتری انتقال داده شده است ولی پروتئین تولید شده فاقد فعالیت زیستی است. چرا؟

- (۱) نیمه عمر mRNA باکتریایی بسیار کوتاه است.
- (۲) mRNA این ژن درون باکتری پردازش نشده است.
- (۳) یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها کدهای ژنتیکی متفاوتی دارند.
- (۴) پروتئین‌های مهارکننده ژن، رونویسی و ترجمه را مختل کرده است.

۷۶- محصولات رونویسی کدام پلیمراز یوکاریوتی پردازش می‌شود؟

- (۱) RNA پلیمراز I
- (۲) RNA پلیمراز III
- (۳) RNA پلیمراز II
- (۴) محصولات رونویسی هر سه پلیمراز پردازش می‌شوند.

۷۷- یک آرکی باکتر یافت شده در چشمه‌های آب گرم دارای یک آنزیم توپوایزومراز اختصاصی است که با صرف ATP باعث ایجاد ابر مارپیچ مثبت در DNA می‌گردد. چنین ویژگی چه مزایایی برای این جاندار غیرعادی دارد؟

- (۱) ایجاد ابر فتر مثبت DNA را به طور غیرمؤثری متراکم می‌کند و جدایی رشته‌ها آسان‌تر می‌شود.
- (۲) ابر فتر مثبت DNA را برای فرایندهایی نظیر همانند سازی آماده می‌کند که نیازمند جداسازی رشته‌های DNA هستند.
- (۳) بیشتر مولکول‌های DNA موجود در طبیعت از نوع ابر فتر منفی هستند و این ویژگی هیچ مزیتی برای باکتری ندارد.
- (۴) ابر فتر مثبت باعث افزایش دمای ذوب (Melting temperature) DNA می‌شود که احتمالاً یک فرایند سازشی برای این باکتری است.

۷۸- تمام ژن‌های زیر متعلق به ژن‌های سرکوبگر هستند، به جز:

- (۱) P₅₃
- (۲) APC
- (۳) BRCA1
- (۴) β -catenin

۷۹- در مورد سنتز DNA های حلقوی چند جنگال همانندسازی دیده می‌شود؟

- (۱) ۱
- (۲) ۲
- (۳) ۳
- (۴) ۴

۸۰- اولین اسید آمینه توسط tRNA به کدام آنتی کد اضافه می‌شود؟

- (۱) AUG
- (۲) UAC
- (۳) ACG
- (۴) UGC

۸۱- آنزیم ترنس کریپیتاز وارونه کدام یک از فعالیت‌های زیر را انجام نمی‌دهد؟

- (۱) DNA پلی‌مراز وابسته به RNA
- (۲) DNA پلی‌مراز وابسته به DNA
- (۳) RNase H
- (۴) Exonuclease

۸۲- کدام یک از آرگانیزم‌های زیر دارای ژن‌های Overlap است؟

- (۱) ویروس
- (۲) باکتری
- (۳) قارچ
- (۴) مخمر

۸۳- کدام یک از انواع اسید نوکلئیک دارای مارپیچ چپ گرد است؟

- (۱) M-RNA
- (۲) T-RNA
- (۳) A-DNA
- (۴) Z-DNA

۸۴- بر اساس قانون چارگوف در DNA کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) میزان آدنین و تیمین مساوی با میزان گوانین و سیتوزین است.
- (۲) میزان آدنین و گوانین مساوی با میزان تیمین و سیتوزین است.
- (۳) میزان آدنین و یوراسیل مساوی با میزان گوانین و سیتوزین است.
- (۴) میزان آدنین و گوانین مساوی با میزان یوراسیل و سیتوزین است.

۸۵- رپرسور ژن بتا گالاکتوزیداز توسط کدام یک از عوامل زیر کدهمی می‌شود؟

- (۱) XmaI
- (۲) PstI
- (۳) Lac I
- (۴) PvuII

۸۶- پایدارترین فرم RNA کدام است؟

snRNA (۴) tRNA (۳) hnRNA (۲) mRNA (۱)

۸۷- کدام یک از آنزیم‌های زیر برای سنتز رشته منقطع لازم نیست؟

Exonuclease (۴) Helicase (۳) Gyrase (۲) Primase (۱)

۸۸- منشاء همانندسازی غنی از چه بازهایی است؟

C, T (۴) A, G (۳) G, C (۲) A, T (۱)

۸۹- از دامینه شدن سیتوزین چه بازی حاصل می‌شود؟

یوراسیل (۴) آدنین (۳) گوانین (۲) تیمین (۱)

۹۰- کدام آنزیم باعث جابه‌جایی مواد ژنتیکی متحرک از یک قسمت DNA به قسمت دیگر می‌شود؟

Endonuclease (۴) Transposase (۳) Transcriptase (۲) Ligase (۱)

www.Sanjesh3.com