

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: آمار و احتمالات کاربردی، آمار و احتمالات کاربردی، آمار و احتمالات مهندسی
رشته تحصیلی/گذ درس: - مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۶
 ۱۱۱۷۰۷۶ - مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۷۱۳۸

- دو شخص در ۵ رقابت تیر اندازی شرکت می کنند و نتیجه‌ی شلیک هایی که در ۱۵ شلیک به هدف، موجود می باشد.
 برای تشخیص این که کدام یک از مهارت بیشتری برخوردارند، از کدام شاخص زیر استفاده می شود؟

۱. ضریب تغییر ۲. واریانس ۳. انحراف چارکی ۴. انحراف معیار

- دم پنکه‌ی از مشاهدات هرگاه میزان چولگی خفیف باشد بین میانگین، میانه و نما، چه رابطه‌ای برقرار است؟ (نماد M متوسط مشاهدات است).

$$\bar{x} - M \cong \psi(\bar{x} + m) \quad .2$$

$$\bar{x} + M \cong \psi(\bar{x} - m) \quad .1$$

$$\bar{x} - M \cong \psi(\bar{x} - m) \quad .4$$

$$\bar{x} + M \cong \psi(\bar{x} + m) \quad .3$$

- برای استقلال ۶ پیشامد، چند شرط لازم است؟

۲۰. ۴

۱۵. ۳

۵۷. ۲

۵۶. ۱

- کدام گزاره درست است؟

۱. اگر B, A مستقل باشند آن گاه B', A' وابسته‌اند.

۲. اگر B, A مستقل باشند آنگاه B', A' نیز مستقلند

۳. اگر B, A ناتهی و مستقل باشند، پس ناسازگارند.

۴. دو بد و مستقل بودن سه پیشامد، استقلال کلی آنها را نتیجه می دهد.

- یک تاس سه بار پرتاب می شود. اگر بدانیم وجه شماره ۱ حداقل یک بار آمده، احتمال آنکه دقیقاً یک بار نآمده باشد چقدر است؟

۱. ۴
۲

۵۷. ۳
۹۱

۷۵. ۲
۹۱

۱. ۱
۳

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: آمار و احتمالات کاربردی، آمار و احتمالات کاربردی، آمار و احتمالات مهندسی
رشته تحصیلی/گذ درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۶ -
 مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۷۰۷۶ -، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۷۱۳۸،

- اگر جدول توان X, Y به فرم زیر باشد، $\text{cov}(X, Y)$ کدام است؟

	X	-۱	۱
Y			
*	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
۰	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

- فرض کنید Y دارای تابع چگالی توان n ثابت است.
 مقدار $E(X/Y = \frac{1}{2})$ کدام است؟

$$\frac{5}{18} \cdot 4$$

$$\frac{C}{\lambda} \cdot 2$$

$$\frac{2C}{\lambda} \cdot 1$$

$$e^{-2} \cdot 3$$

$$\frac{1}{e^2} \cdot 2$$

$$1. \text{ صفر}$$

- اگر X دارای توزیع پواسن باشد و $P(X = ۰) = P(X = ۱)$. آنگاه ()

$$7 \cdot 4$$

$$-9 \cdot 3$$

$$12 \cdot 2$$

$$1. \cdot 6$$

-۱۰ اگر متغیر تصادفی X دارای تابع مولد گشتاورهای $M_X(t) = e^{rt + \frac{\lambda}{r}t^2}$ است، آنگاه چه توزیعی است؟

$$N(\mu, \sqrt{\lambda}/\mu) \cdot 4$$

$$N(\mu, \lambda) \cdot 3$$

$$N(\mu, \lambda) \cdot 2$$

$$N(\mu, \frac{\lambda}{\mu}) \cdot 1$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: آمار و احتمالات کاربردی، آمار و احتمالات کاربردی، آمار و احتمالات مهندسی
رشته تحصیلی/گذ درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۶ -
 مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۷۰۷۶ -، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۷۱۳۸،

۱۱- اگر طول یک بزرگراه را بازه $(1, 5)$ نشانه گذاری کنیم، نقاطی که در طول یکسال احتیاج به تعمیر دارد، دارای توزیع بتا با $\beta = 2, \alpha = 3$ است. احتمال این که حداقل نیمه ای اول بزرگراه در یکسال احتیاج به تعمیر داشته باشد، برابر است با:

$$\frac{5}{16} .^4$$

$$\frac{1}{2} .^3$$

$$\frac{11}{16} .^2$$

$$.1 .^1$$

۱۲- اگر $T = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$ باشد، آنگاه $E(T)$ برابر است با:

$$n - 1 .^4$$

$$3 .^3$$

$$n .^1$$

۱۳- تقریب نرمال برای توزیع دو جمله ای زمانی p در همسایگی ایست که:

 p

در همسایگی ۱ باشد.

در همسایگی $\frac{1}{4}$ باشد

۱. p در همسایگی $\frac{1}{2}$ باشد.

۲. p در همسایگی صفر باشد.

۱۴- در یک نظرخواهی از ۲۰۰ نفر در مورد احداث پارک علوم، ۱۰۴ نفر از این طرح استقبال نکرده اند. یک فاصله اطمینان 99% برای نسبت کسانی که از این طرح استقبال نکرده اند برابر است با: $0.005 = 2/58$

$$(0.462 < p < 0.578) .^2$$

$$(0.438 < p < 0.562) .^1$$

$$(0.422 < p < 0.538) .^4$$

$$(0.398 < p < 0.562) .^3$$

۱۵- اگر متغیر تصادفی X دارای توزیع دو جمله ای با پارامترهای $p, n = 5$ باشد، کدام یک از فرض های زیر ساده اند؟

$$H_0: p \leq \frac{1}{2} .^4$$

$$H_0: P > \frac{1}{2} .^3$$

$$H_0: p \neq \frac{1}{2} .^2$$

$$H_0: p = \frac{1}{2} .^1$$

۱۶- اگر مشاهدات X_1, X_2, \dots, X_{25} از توزیع نرمال با میانگین μ و واریانس 100 دارای میانگین نمونه ای $\bar{x} = 76$ باشند، آماره ای آزمون برای فرض $H_0: \mu = 75$ در مقابل $H_1: \mu > 75$ برابر است با:

$$-0.5 .^4$$

$$-0.1 .^3$$

$$0.5 .^2$$

$$0.1 .^1$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: آمار و احتمالات کاربردی، آمار و احتمالات کاربردی، آمار و احتمالات مهندسی
رشته تحصیلی/گذ درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۶ -
 مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۷۰۷۶ -، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۷۱۳۸،

-۱۷ تعريف P - مقدار عبارتست از:

۱. کمترین سطح معنی داری که H_1 را رد می کنیم

۲. بیشترین سطح معنی داری که H_1 را رد می کنیم.

-۱۸ برای آزمون افرض $\sigma^2 > \sigma_0^2$ در مقابل $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ را رد می کنیم اگر:

$$\chi^2 > \chi_{1-\alpha, n-1}^2$$

$$\chi^2 > \chi_{\alpha, n-1}^2$$

$$z > z_{\alpha}$$

$$t > t_{\alpha, n-1}$$

-۱۹ اگر $Y = \alpha + \beta X_i + e_i$ معادله رگرسیون باشد، کدام یک از روابط زیر درست است؟

۱. X_i ها متغیر تصادفی نیستند.

۲. e_i دارای توزیع نرمال با میانگین μ و واریانس σ^2 است

۳. X_i ها دارای توزیع نرمال با میانگین $\alpha + \beta X_i$ و واریانس σ^2 هستند.

۴. دارای توزیع نرمال با میانگین $\hat{\alpha}$ و واریانس $\frac{\sigma^2}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$ است.

-۲۰ در یک مدل رگرسیونی، برای آزمون فرض $H_0: \alpha = 0$ آماره آزمون تحت فرض $H_1: \alpha \neq 0$ دارای چه توزیعی می باشد؟

$$N(0, 1)$$

$$t_{n-1}$$

$$t_{n-2}$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: آمار و احتمالات کاربردی، آمار و احتمالات کاربردی، آمار و احتمالات مهندسی
روش تحصیلی / گذ درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۶ -
مehندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۷۰۷۶ -، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۷۱۳۸،

سوالات تشریحی

۱. نمره ۱,۵۰

- با روش کدگذاری میانگین و واریانس جدول توزیع فراوانی زیر را محاسبه کنید.

f_i	رده بندی	
۹	۱۴/۵-۱۹/۵	۱
۳۷	۱۹/۵-۲۴/۵	۲
۴۱	۲۴/۵-۲۹/۵	۳
۱۳	۲۹/۵-۳۴/۵	۴
۱۰	۳۴/۵-۳۹/۵	۵
۱۰۰	جمع	

۲. نمره ۱,۰۰

- در یک کلاس ۳۵ درصد دانشجویان مرد هستند و ۲۰ درصد از مادران و ۵ درصد زنان مردود شده اند.
دانشجویی به تصادف انتخاب می شود. اگر این دانشجو مردود شده باشد، احتمال این که مرد باشد چقدر است؟

۳. نمره ۱,۷۵

- احتمال اینکه در یک خط تولید کالایی معیوب باشد برابر با 0.001 است. در یک نمونه ۷ تایی مطلوب است احتمال این که:

- (الف) کالای معیوب پیدا نشود.
- (ب) بیش از ۵ کالا معیوب باشد.
- (ج) دقیقاً ۳ کالا معیوب باشد.

۴. نمره ۱,۰۰

- اگر متغیر تصادفی X دارای توزیع نرمال با میانگین μ و واریانس σ^2 باشد، μ و σ^2 را به روش درستنمایی ماکسیمم، بر اساس مشاهدات یک نمونه n تایی، برآورد کنید.

۵. نمره ۱,۷۵

- فرض کنید X در فاصله θ تا θ به طور یکنواخت توزیع شود. یک مقدار X را مشاهده می کنیم و می خواهیم فرض $H_0: \theta = 1,5$ را در مقابل $H_1: \theta > 1,5$ آزمون کنیم. تصمیم می گیریم که اگر مقدار نمونه از ۹۹٪ تجاوز کند H_0 را رد کنیم. احتمال خطای نوع اول، احتمال خطای نوع دوم، و توان آزمون را حساب کنید.

تصحیح الاسم

نامه صحت

ج

الله

سید

عادي

الف

ز

ب

ر

ح

ح

د

ع

ع

ف

د

ح

الله

الله

الله

الله

د

ح

الله

عادي

عادي