

نام درس: آسیب‌شناسی روانی (۲) تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: —  
 رشته تحصیلی و کُد درس: روانشناسی - علوم تربیتی (مشاوره) - (۱۲۱۷۰۲۹) - (۱۲۱۷۰۶۱) - (۱۲۱۱۰۹۸) زمان آزمون: تستی: ۵۰ تشریحی: — دقیقه  
 — آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗  
 کُد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: — مجاز است.

امام علی<sup>(ع)</sup>: برتری مردم به یکدیگر، به دانش‌ها و خردهاست؛ نه به ثروت‌ها و تبارها.

۱. به وضعیتی که در آن خلق فرد بین دوره‌هایی از افسردگی اساسی و رفتار مانایی در نوسان است، چه گفته می‌شود؟  
 الف. اختلال عاطفی فصلی      ب. اختلال افسرده خویی      ج. اختلال ادواری خویی      د. اختلال دو قطبی
۲. سن معمولی برای شروع افسردگی چند سال می‌باشد و بیشتر در میان چه جنسی شایع می‌باشد؟  
 الف. ۲۴ و ۲۹ - زنان      ب. ۲۴ و ۳۹ - مردان      ج. ۲۰ و ۲۵ - بطور مساوی      د. ۳۰ و ۳۵ - زنان
۳. طبق طبقه‌بندی DSM-IV افسردگی همراه با مالیخولیا چه نامیده می‌شود؟  
 الف. افسردگی برون زاد      ب. افسردگی درون زاد      ج. افسردگی مضاعف      د. اختلال افسرده خویی
۴. به نظر لوینسون و همکاران علت افسردگی چه چیزی می‌باشد؟  
 الف. کاهش تماس‌های اجتماعی      ب. پاداش به خاطر رفتارهای افسرده وار  
 ج. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت      د. محیط خارج از کنترل شخص
۵. میزان خودکشی و مرگ و میر ناشی از خودکشی به ترتیب در میان چه جنسی بیشتر است؟  
 الف. زنان - زنان      ب. مردان - زنان      ج. هر دو مساوی می‌باشند      د. زنان - مردان
۶. چند درصد از اختلالات خلقی، مانیک - دپرسیو هستند؟  
 الف. ۵ تا ۲۰ درصد      ب. ۱۰ تا ۲۰ درصد      ج. ۱۵ تا ۲۵ درصد      د. ۱۵ تا ۲۰ درصد
۷. کدام بیماری اغلب در نوجوانی، با دوره‌های طولانی از ناتوانی شدید اجتماعی و کارکرد مشخص می‌شود؟  
 الف. اسکیزوفرنی      ب. جنون زودرس      ج. جنون مانیک - دپرسیو      د. روان گسیختگی
۸. به نظر کراپلین کدام مورد از محدودیتهای مفهوم جنون زودرس نمی‌باشد؟  
 الف. هذیان و توهمات شدید مشخصه عود آن می‌باشد      ب. بیماری محدود به جوانترها نمی‌باشد  
 ج. در برخی افراد بهبودی ایجاد می‌شود      د. همیشه به زوال عقلی ختم نمی‌شود
۹. اصطلاح هبفرنیا مربوط به کدام یک از زیرمجموعه‌های اسکیزوفرنیا می‌شود؟  
 الف. پارانوئید      ب. آشفته      ج. کاتا تونیک      د. باقی مانده
۱۰. میزان کلی خودکشی در اسکیزوفرنیا در حدود چند درصد می‌باشد؟  
 الف. ۲ تا ۱۰ درصد      ب. ۵ درصد      ج. ۵ تا ۱۰ درصد      د. ۱۰ درصد

نام درس: آسیب‌شناسی روانی (۲) تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: —  
 رشته تحصیلی و کُد درس: روانشناسی - علوم تربیتی (مشاوره) - (۱۲۱۷۰۲۹) - (۱۲۱۷۰۶۱) - (۱۲۱۱۰۹۸) زمان آزمون: تستی: ۵۰ تشریحی: — دقیقه  
 — آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗  
 کُد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: — مجاز است.

۱۱. ضایعات در کدام قسمت مغز در ۹۰٪ موارد باعث ایجاد اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهم شنوایی می‌شود؟

الف. لوپ تمپورال نیمکره چپ

ب. لوپ تمپورال طرف راست

ج. پرده لوپ فرونتال

د. بطن‌های مغزی

۱۲. عوارض کلرپرومازین که به نشانه‌های خارج هرمی معروف می‌باشند کدام مورد می‌باشد؟

الف. خشکی دهان و گلو

ب. نشانه‌های پارکینسون و حرکت پریشی دیررس

ج. یبوست و افسردگی

د. کاهش یا افزایش وزن

۱۳. شروع اختلالات شخصیت از کدام دوره می‌باشد؟

الف. دوره میانسالی

ب. دوره بزرگسالی

ج. دوره نوجوانی یا کودکی اولیه

د. دوره پیری

۱۴. اختلالات شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپال در کدام طبقه از دسته‌بندی DSM-IV قرار می‌گیرد؟

الف. هیجانی، خودنما و پرزرق و برق

ب. ترسو یا مضطرب

ج. عجیب و غریب یا نامتعارف

د. فعل‌پذیر - پرخاشگر

۱۵. شیوع اختلال شخصیت پارانویا چند درصد است و بیشتر در میان چه جنسی دیده می‌شود؟

الف. ۰/۵ تا ۲/۵ درصد - مردان

ب. ۱ تا ۲/۵ درصد - مردان

ج. ۰/۵ تا ۲/۵ درصد - زنان

د. ۲ تا ۵/۳ درصد - بطور مساوی

۱۶. کدام اختلال به اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه معروف است؟

الف. اسکیزوئید

ب. اسکیزوتایپال

ج. پارانویا

د. مرزی

۱۷. نام دیگر اختلال شخصیت ضداجتماعی چه می‌باشد؟

الف. نارسیس

ب. هیستریک

ج. اسکیزوفرنی شبه نروتیک

د. سایکو پات

۱۸. کمک به درمان‌جو جهت کنارآمدن با مشکلات خانوادگی و خارج خانوادگی، شامل کدام نوع درمان اختلال شخصیت، ضداجتماعی می‌باشد؟

الف. روان درمانی

ب. آموزش آگاهی هیجانی

ج. رویکرد چند سیستمی مبتنی بر خانواده

د. بهبودی مشکلات ارتباطی

نام درس: آسیب‌شناسی روانی (۲) تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: —  
 رشته تحصیلی و کُد درس: روانشناسی - علوم تربیتی (مشاوره) - (۱۲۱۷۰۲۹) - (۱۲۱۷۰۶۱) - (۱۲۱۱۰۹۸) زمان آزمون: تستی: ۵۰ تشریحی: — دقیقه  
 — آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗  
 کُد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: — مجاز است.

۱۹. کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

الف. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی می‌توانند کالری مصرفی خود را تنظیم کنند

ب. پیامدهای جسمانی پراشتهایی و بی‌اشتهایی روانی متفاوتند

ج. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی تمایل به جلب رضایت دیگران دارند

د. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی مرضی بودن رفتارشان را می‌پذیرند

۲۰. طبق طبقه‌بندی DSM-TV چند درصد وزن بدن مبتلا به بی‌اشتهایی روانی از دست می‌رود؟

الف. ۵ تا ۱۰ درصد ب. ۱۵ درصد ج. ۱۰ درصد د. ۱۵-۲۰ درصد

۲۱. در کدام نوع از بی‌اشتهایی روانی، صفات وسواسی - جبری نشان داده می‌شود؟

الف. نوع پرخوری ب. نوع پرخوری - پاکسازی ج. نوع محدود کننده د. هیچکدام

۲۲. کدام گزینه در مورد پراشتهایی روانی صحیح نمی‌باشد؟

الف. افراد مبتلا در مورد عدم جذابیت حساس و ترس از چاق شدن دارند

ب. تلاش‌های آنان برای مقابله با چاقی راحت‌تر از بی‌اشتهایان روانی است

ج. دوره‌های پرخوری تکراری

د. رفتارهای نامناسب جبرانی

۲۳. طبق نظریه زیست‌شناختی عامل ایجاد احساس گرسنگی چه چیزی می‌باشد؟

الف. سطح پایین سروتونین ب. هیپوتالاموس شکمی

ج. تعادل میان دو ناحیه هیپوتالاموس د. هیپوتالاموس جانبی

۲۴. چند درصد وزن بدن زن و مرد را چربی تشکیل می‌دهد؟

الف. ۲۵٪ زن - ۱۸٪ مرد ب. ۲۰٪ زن - ۱۸٪ مرد ج. ۱۵٪ زن - ۲۰٪ مرد د. ۱۸٪ زن - ۲۵٪ مرد

۲۵. کدام مرحله از خواب NON-REM خواب عمیق نامیده می‌شود؟

الف. مرحله اول ب. مرحله دوم و سوم ج. مرحله سوم و چهارم د. مرحله چهارم

۲۶. رویا دیدن در چه مرحله‌ای از خواب اتفاق می‌افتد؟

الف. خواب با حرکات سریع چشم ب. خواب متناقض

ج. خواب عمیق د. الف و ب

نام درس: آسیب‌شناسی روانی (۲) تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: —  
 رشته تحصیلی و کُد درس: روانشناسی - علوم تربیتی (مشاوره) - (۱۲۱۷۰۲۹) - (۱۲۱۷۰۶۱) - (۱۲۱۱۰۹۸) زمان آزمون: تستی: ۵۰ تشریحی: — دقیقه  
 — آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗  
 کُد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: — مجاز است.

۲۷. بدخوابی و نابهنجاریهای همراه خواب ناشی از کدام اختلال خواب می‌باشد؟

الف. اختلال مربوط به اختلال روانی دیگر

ب. اختلالهای اولیه خواب

ج. اختلال ناشی از یک بیماری جسمانی

د. اختلال ناشی از مواد

۲۸. دور باطل اضطراب - بی‌خوابی مربوط به کدام یک از انواع بدخوابی‌ها می‌باشد؟

الف. بی‌خوابی اولیه

ب. حمله خواب

ج. پرخوابی اولیه

د. بدخوابی

۲۹. وقفه‌های تنفسی ۱۰ ثانیه‌ای موقتی که در طی خواب بوجود می‌آید چه نامیده می‌شود؟

الف. نارکولپسی

ب. کابوس

ج. آپنه

د. وحشت شبانه

۳۰. کدام گزینه از درمانهای وحشت شبانه و خوابگردی می‌باشد؟

الف. روان درمانی فردی

ب. خانواده درمانی

ج. مصرف دیازپام

د. همه موارد

۳۱. در درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال هویت جنسی، از کدام یک از روشهای روان‌درمانی استفاده نمی‌شود؟

الف. جلسات آموزش رفتارهای مربوط به هویت جنسی واقعی

ب. آموزش والدین

ج. استفاده از برنامه‌های رفتاری جهت تقویت رفتارهای مربوط به جنس واقعی

د. روان تحلیل‌گری

۳۲. کدام مورد از اختلالات بدکاری جنسی از نظر جامعه مضر و نامناسب شمرده می‌شود؟

الف. پارافیلیاها

ب. اختلال ناشی از مواد

ج. اختلال تحریک جنسی

د. اختلال مربوط به درد جنسی

۳۳. فرایند جستجوی معنی (معنی‌دار کردن) به چه معنی است؟

الف. میزان استرسی که در بیماران MS وجود دارد

ب. دلیلی که بیمار سعی در پیدا کردن آن به علت بیماری شدید جسمی می‌باشد

ج. میزان پیشرفت بیماری که تحت تأثیر استرس ناشی از تعارضات فردی است

د. میزان سرعت پردازش مبتلایان به MS در مقایسه با افراد سالم

۳۴. بهترین درمان مبدل پوشی کدام مورد می‌باشد؟

الف. روان‌درمانی

ب. استفاده از داروی سیلدنافیل

ج. خانواده درمانی

د. بیزاری درمانی



نام درس: آسیب شناسی روانی (۲) تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: —  
 رشته تحصیلی و کد درس: روانشناسی - علوم تربیتی (مشاوره) - (۱۲۱۷۰۲۹) - (۱۲۱۷۰۶۱) - (۱۲۱۱۰۹۸) زمان آزمون: تستی: ۵۰ تشریحی: — دقیقه  
 — آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗  
 کد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: — مجاز است.

۳۵. آشفتگی زبانی شامل کدام یک از ویژگیهای آلزایمر می باشد؟

الف. آمنزی ب. آپراکسی ج. آفازی د. آگنوزیا

۳۶. در کدام مرحله از بیماری آلزایمر بیمار برای کارهای معمولی خود نیازمند کمک می باشد؟

الف. دمانس متوسط ب. دمانس شدید ج. دمانس خفیف د. دمانس مبهم

۳۷. شروع MS به شکل بدخیم از چه سنی می باشد؟

الف. قبل از ۵۰ سالگی ب. ۴۰ سالگی ج. ۳۰ - ۴۰ سالگی د. ۶۰ - ۵۰ سالگی

۳۸. علت افسردگی بین مبتلایان به MS چیست؟

الف. آسیب برونی ب. واکنش روان شناختی

ج. دخالت هردو عامل الف و ب د. فعلاً مشخص نشده است

۳۹. کدام مورد از عوامل ایجاد بیماری پارکینسون نمی باشد؟

الف. ضربه های روانی ب. تخریب غلاف میلین اطراف نرونهای مغزی

ج. آشفتگی هیجانی د. شخصیت غیر قابل انعطاف

۴۰. اولین اختلال شایع عصب شناختی کدام مورد می باشد؟

الف. صرع ب. صدمات سر ج. سکته د. پارکینسون