



تعداد سوالات: فنی ۳۰ تکمیلی ۳۰ تشریحی
زمان امتحان: تستی و تکمیلی ۴۰ دقیقه تشریحی ۱۰ دقیقه
تعداد کل صفحات: ۳

نام درس: روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی: گرایش: روانشناسی
کد درس: ۱۲۱۳۱۱ (طرح تجميع، رشته روانشناسی: آزمون و ارزشیابی)

۱. تحلیل‌گران روانی سنتی بهنجاری را چگونه تبیین می‌کنند؟
الف. در حد متوسط ب. در حد آرمانی ج. در سطح سازگاری د. در سطح آماری
۲. خطر رویکرد ناپیوستگی در نابهنجاری چیست؟
الف. آشفتگی خاص مورد توجه اندک قرار می‌گیرد
ب. منحصر به فرد بودن آسیب‌شناسی روانی
ج. افراد در مکانهای دور از روابط اجتماعی سالم نگهداری می‌شوند.
د. افراد متفاوت به صورت نسبتاً مشابه نگریسته می‌شوند.
۳. کدام گزینه در مورد میزان خودکشی در افسردگی کودک صحیح‌تر است؟
الف. شایع ب. نسبتاً شایع ج. اندک د. در کودکان افسرده خودکشی وجود ندارد
۴. مکیدن شست از کدامیک اختلالات کودک چهارگانه می‌باشد؟
الف. عادی ب. سلوکی ج. نوروپاتیکی د. پسیکوتیکی
۵. در طبقه‌بندی DSMIV (۱۹۹۴) اختلال تورت جزء کدام دسته قرار می‌گیرد؟
الف. اختلال ایذایی ب. اختلال عقب‌ماندگی روانی ج. اختلال یادگیری د. اختلال تیک
۶. کدامیک از مهارت‌های زیر در اختلال ریاضی اهمیت چندانی ندارد؟
الف. حرکتی ب. زبانی ج. ادراکی د. توجهی
۷. در صورتی که اختلال زبان بیانی، اکتسابی باشد کدام اشکال در بیان دیده می‌شود؟
الف. سرعت زیاد ب. کندی گفتار ج. ریتم غیر معمول د. بریده گویی
۸. اختلال آمیخته زبان دریافتی - بیانی که بین ۳ تا ۹ سالگی ظاهر می‌شود و با تشنج همراه است چه نام دارد؟
الف. سندرم رت ب. سندرم آسپرجر ج. سندرم لاندو-کلفنر د. سندرم تورت
۹. کدام دیدگاه روانشناسی، اضطراب را عامل اصلی‌تری برای لکنت زبان می‌داند؟
الف. شناختی ب. رفتاری ج. وجودی د. انسان‌گرایی
۱۰. در کودکان اوتیستیک منظور از لالی عاطفی چیست؟
الف. عدم ارتباط ب. سردی نسبت به دیگران ج. آشفتگی از تغییر محیط د. فقدان کامل تکلم
۱۱. کدامیک از گزینه‌های زیر، از ویژگی‌های کودک اوتیستیک است؟
الف. دارا بودن تخیل ب. استفاده از ضمیر اول شخص ج. حافظه آنی قوی د. اندام غیر طبیعی
۱۲. کدام رفتار خود آسیب‌گرانه در کودکان اوتیستیک شایع‌تر است؟
الف. کندن و کشیدن مو ب. دندان گرفتن دست ج. چنگ زدن د. سیلی زدن به صورت
۱۳. کدامیک از نظریه‌های روانشناسی نقطه نظر محیطی را در سبب شناسی اوتیسم مورد توجه قرار داده‌اند؟
الف. تحلیل روانی ب. شناخت‌گرایی ج. رفتارگرایی د. انسان‌گرایی
۱۴. در مورد منشأ اختلال اوتیسم آسیب چه قسمت از دستگاه عصبی نقش مهم‌تری دارد؟
الف. نخاع ب. مغز ج. نیمکره چپ د. نیمکره راست




اداره آزمون و ارزشیابی
(طرح تجمیع رشته روانشناسی: ۱۳۸۷/۲۸)

تعداد سوال: ۳۰ نیمی
نکته: ۴۰ نیمی
نکته: ۳۰ نیمی
تعداد کل صفحات: ۳

نام درس: روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی: گرایش: روانشناسی
کلاس: ۱۲۱۳۱۱- (طرح تجمیع رشته روانشناسی: ۱۳۸۷/۲۸)

۱۵. الکتروانسفالوگرافی (EEG) کودکان اوتیستیک دارای چه مشخصه‌ای است؟
الف. یکسانی امواج آلفا و بتا
ب. الگوی غیر طبیعی
ج. تفاوت در امواج تتا
د. ولتاژ پایین‌تر از یک
۱۶. تفاوت بین اسکیزوفرنی کودک و اسکیزوفرنی بزرگسالی چیست؟
الف. مشکلات ارتباطی
ب. عاطفه نامنظم
ج. عقب ماندگی ذهنی
د. مشکلات اجتماعی
۱۷. در مورد اثر جنسیت در ابتلا به اسکیزوفرنی کودک و اوتیسم کدام گزینه صحیح‌تر است؟
الف. اسکیزوفرنی در پسران شایع‌تر است
ب. اوتیسم در پسران شایع‌تر است
ج. تفاوت جنسیتی در اسکیزوفرنی وجود ندارد
د. تفاوت جنسیتی در اوتیسم وجود ندارد
۱۸. کدام گزینه ذیل بیشتر وجه ممیزه اوتیسم و اسکیزوفرنی کودک می‌باشد؟
الف. هذیان
ب. رشد حرکتی طبیعی
ج. نقص در تکلم
د. نقص در مهارت‌های اجتماعی
۱۹. در مورد این نظر که اوتیسم نتیجه غفلت نمی‌باشد، کدام عقیده مورد قبول کارشناسان است؟
الف. عدم توافق کامل
ب. عده‌ای موافق
ج. توافق نسبی
د. توافق کامل
۲۰. اختلالی که در آن حرکات کلیشه‌ای از قبیل شستن دست‌ها یا به هم پیچیدن آن دیده می‌شود، چه نام دارد؟
الف. سندرم بلوبری
ب. پسیکوز مربوط به رشد
ج. سندرم رت
د. پسیکوز همزیستی
۲۱. از نظر بتل‌هایم کودکان مبتلا به اوتیسم برای عمل را از دست داده‌اند.
الف. توان
ب. تکانش
ج. مهارت فردی
د. آستانه تحریک
۲۲. تفاوت نظریه دلوریه با فروید در مورد اسکیزوفرنی کودک چیست؟
الف. فرار از تجارب تحمل ناپذیر
ب. دانستن مرزهای روانشناختی و بدنی
ج. کوشش دیوانه‌وار برای کشف خویشتن
د. اهمیت مشکلات خاص بیماری در حال حاضر
۲۳. کدامیک از اندیشمندان اسکیزوفرنی کودک را تا اندازه زیادی ناشی از ضایعه عضوی می‌دانند؟
الف. بندر
ب. بتل‌هایم
ج. گلفارب
د. دلوریه
۲۴. ماهیت پسیکوز همزیستی چیست؟
الف. تمایل فرزند به طرف مادر
ب. دو جانبه‌گری
ج. نیاز به احساس اطمینان
د. مقابله با استقلال
۲۵. استفاده از مواد مخدر در کدام دسته از اختلالات سلوکی قرار می‌گیرد؟
الف. ناپرخاشگر
ب. پرخاشگر
ج. غیر اجتماعی شده
د. اجتماعی شده ضعیف
۲۶. برای این که منفی‌گرایی به عنوان اختلال نافرمانی تلقی شود، چه مدت باید استمرار یابد؟
الف. سه ماه
ب. شش ماه
ج. نه ماه
د. یکسال
۲۷. خوردن دایمی مواد غیر خوراکی، جزء کدام دسته از اختلالات تغذیه‌ای محسوب می‌شود؟
الف. تغذیه ناقص
ب. اختلال تغذیه خردسالی
ج. هرزه خواری
د. نشخوار کنندگی
۲۸. از نظر تشخیص افتراقی تیک با کدام سندرم مشتبه می‌شود؟
الف. پسیکوز مربوط به رشد
ب. رت
ج. بلوبری
د. تور



نام درس: روانشناسی مرضی کودکان
رشته تحصیلی: گرایش روانشناسی
کد درس: ۱۲۱۳۱۱- (طرح تجمیع، رشته روانشناسی: ۱۲۱۷۳۸)

تعداد سؤال: ۳۰ تکمیلی
تعداد کل صفحات: ۳

زمان امتحان: تستی و تکمیلی ۴۰ دقیقه
نقشه تشریحی

۲۹. معمولاً واکنش دلبا پسی نقطه مقابل کدام واکنش قرار می گیرد؟
الف. افسردگی ب. فوبی ج. کناره گیری د. اضطرابی
۳۰. در درمان وسواس کودکان کدام روش درمانی موفق تر است؟
الف. شناختی ب. رفتارگرایی عامل ج. تحلیل روانی د. شناختی - رفتاری